

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

**BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES  
CHARENTE - CHARENTE-MARITIME - DEUX-SEVRES - VIENNE  
SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
13, Route de la FORÊT - BIARD - 86000 POITIERS - TEL. (49) 58.39.02

ABONNEMENT ANNUEL

70

C. C. P. LIMOGES 4. 752. 22. X.  
Sous Régisseur de recettes et d'avances  
AVERTISSEMENTS AGRICOLES  
13, Rte de la Forêt - Biard - 86000 POITIERS

BULLETIN N° 207 (Edition Générale n° 18/81 du 16 Juillet 1981)

VIGNEMILDIOU

Il convient d'appliquer le traitement conseillé dans notre dernier bulletin si cela n'a pas encore été fait et tout particulièrement dans les secteurs où de violents orages sont intervenus depuis lors.

Il en est de même pour l'oïdium.

VERS DE LA GRAPPE

Le vol de *Cochylis* de deuxième génération s'étant fortement intensifié à partir du 10 Juillet, on peut prévoir les premières éclosions importantes lors des journées du 18 au 20 Juillet. Il convient donc, dans les secteurs où ce ravageur était déjà dominant en première génération, d'effectuer un traitement début de semaine prochaine.

Par contre, le vol d'*Eudémis* de deuxième génération a débuté mais très faiblement le 10 Juillet et il est encore trop tôt pour intervenir dans les zones où cette espèce est prépondérante.

POMMIERS POIRIERS

Que ce soit pour les maladies ou pour les ravageurs, les indications de notre dernier bulletin restent valables, en particulier pour le *Carpocapse* dont l'activité (vol et pontes) est toujours importante.

CULTURES LEGUMIERESTEIGNE DU POIREAU

Le troisième vol s'est brusquement intensifié en zones précoces à partir du 10 Juillet ce qui, compte tenu des températures actuelles relativement basses pour la saison, place les nouvelles éclosions vers le 19 Juillet, date à laquelle il faut envisager impérativement un traitement dans ces zones.

Dans les secteurs plus tardifs (Vienne) le vol vient à peine de commencer et il est encore trop tôt pour intervenir.

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

De très importantes sorties de taches ont eu lieu dans la période du 11 au 15 Juillet dans de nombreux secteurs. L'essentiel est d'éviter la contamination des tubercules soit en limitant l'extension des foyers par application de fongicide à effet curatif (*Acylon P* à 2 Kg/ha de p.c.) si la récolte est encore lointaine soit en détruisant les fanes en fin de végétation par voie mécanique ou chimique si la récolte est proche.

Le Chef de la Circonscription Phytosanitaire  
"Poitou-Charentes" :

R. GUILLEMET

Imprimé à la Station le 16 Juillet 1981  
Précédente Note : Bulletin n° 206 du 9.7.81